



NEWMECTIN 1.8 CE

Abamectina
Insecticida – Concentrado Emulsionable
No. de registro: RSCO-INAC-0174-322-009-002

Composición:

Composición porcentual	
Ingrediente activo	% p/v
Abamectina (Avermectina).....	
Mezcla de Avermectinas B1 contenido no más de 80% de avermectina B1a y no menos de 20% de avermectina B1b (Equivalente a 18.4 g de I.A/ L a 20°C)	1.82
Ingredientes inertes	
Solventes, agente emulsificante, humectante y retenedor de humedad.....	98.18
Total	100.00

Compatibilidad:

Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

Cultivos:

Cultivo	Plaga	Dosis L/Ha	Observaciones	LMR
Jitomate (10)	Minador de hoja (<i>Liriomyza spp</i>)	0.5-1.5	Aplicación al follaje.	0.01

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

LMR: Límite máximo de residuos.

Método para preparar y aplicar el producto

Antes de la aplicación de **Newmectin 1.8 CE** verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Se deberá trabajar sobre superficies estables en la que el envase no se incline, Se utilizarán sólo los instrumentos que faciliten el abrir envases. Utilizar herramientas adecuadas para mezclar y verter. Evitar salpicaduras. Abrir, verter, medir y mezclar en una zona bien ventilada. Durante el manejo, preparación y aplicación de **Newmectin 1.8 CE** siempre utilice el equipo de protección personal.

Contraindicaciones:

No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

Fitotoxicidad:

Newmectin 1.8 CE no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.